

OCHRANA KUKURICE

proti burinám – technologické riešenia

BASF

We create chemistry

Ochrana proti živočíšnym škodcom



Postemergentná aplikácia proti trávovitým a dvojkličnolistovým burinám ideálne vo fáze 3 – 4 pravých listov burín do 6. listu kukurice.

Skoro postemergentná aplikácia proti trávovitým a dvojkličnolistovým burinám ideálne vo fáze 2 – 3 pravých listov s pôdnym účinkom

Postemergentná aplikácia proti dvojkličnolistovým burinám, ideálne vo fáze 2 – 4 pravých listov burín a maximálne do 6. listu kukurice

Preemergentná a skoro postemergentná aplikácia proti jedno a dvojkličnolistovým burinám. Skorá post aplikácia (1–3 listy kukurice) trávovité buriny max. do 1,5 pravých listov a dvojkličnolistové buriny max. do 2 pravých listov.

Vaztak® Pro
0,25 l/ha

Kelvin® Trio + Dash
440 g/ha + 1 l/ha

**Spectrum®
+ Kelvin® Trio
+ Dash**
obchodný balík

40 ha

Arrat® + Dash
0,2 kg/ha + 1 l/ha

Akris®
3,0 l/ha

Fáza BBCH 00 05 10 13 14 16 17 – 32 40 50 60 69/70

Ježatka kuria noha
Echinochloa crus-galli

Mohár sivý
Setaria pumila

Loboda konárístá
Atriplex patula

Láskavec ohnutý
Amaranthus retroflexus

Rumanček pravý
Chamomilla recutita

Durman obyčajný
Datura stramonium

Mrlík biely
Chenopodium album

Pichliač roľný
Cirsium arvense

