



Cabrio® Top

■ **FUNGICÍD** ■ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 05-02-0678



Charakteristika

Postrekový fungicídny prípravok vo forme vodorozpustných granúl zo skupiny strobilurínov s translaminárnym a lokálnym systémovým účinkom proti hubovým chorobám viniča.

Zloženie

pyraclostrobin 50 g/kg
metiram 550 g/kg



Aplikačná dávka prípravku

2,0 kg/ha



Použitie v plodinách

vinič hroznorodý



Doporučené množstvo vody

1000 l/ha



Ochranná doba

35 dní



Letecká aplikácia

nie je



Miešateľnosť

Prípravok Cabrio® Top je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Fyzikálnu miešateľnosť s kvapalnými hnojivami vykonajte odskúšaním.

Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky.

Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby.

V prípade zmesi je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390	Kvapalné hnojivá	Fungicidy	Insekticidy	Rastové regulátory	Graminicídy
–	áno	áno	áno	–	–



Balenie:

10 l HDPE kanister plnený do 6 kg

Dôležité zmeny od posledného vydania: **žiadne**



1. SPÔSOB ÚČINKU

Cabrio® Top je kombinovaný fungicíd. Účinné látky zabraňujú klíčeniu spór a redukovujú rast mycélia a sporuláciu. Najlepší účinok sa dosiahne pri preventívnej aplikácii.

Účinná látka pyraclostrobin je fungicídna látka zo skupiny strobilurínov, ktorá je po aplikácii prijímaná ošetrovanými časťami rastlín a má lokálne systémový a translaminárny účinok. Môžu tak byť zasiahnuté aj štádiá húb v hlbších vrstvách rastlinných pletív. Navyac je účinná látka viazaná na voskovú vrstvičku a túto povrchovú ochranu dopĺňa a posilňuje kontaktná účinná látka metiram. Tým je účinne obmedzené klíčenie nalietaujúcich spór a zabraňuje sa ďalšej infekcii.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Červená spála viniča	<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>
Čierna škvrnitosť viniča	<i>Phomopsis viticola</i>
Múčnatka viniča	<i>Uncinula necator</i>
Peronospóra viniča	<i>Plasmopara viticola</i>
Pleseň sivá	<i>Botrytis cinerea</i>

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia.

4. REGISTRovaná APLIKÁCIA

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka na ha	Ochranná doba (dni)	Poznámka
vinič	múčnatka viniča	2,0 kg (0,2 %)	35	
	peronospóra viniča	2,0 kg (0,2 %)	35	

5. ODPORUČENIE K APLIKÁCI

Pri mnohých fungicídoch existuje všeobecne riziko vzniku rezistentných kmeňov patogénov. Preto nemôže byť pri obzvlášť nepriaznivých podmienkach vylúčená zmena účinnosti prípravku. Musia byť preto bezpodmienečne dodržané doporučené dávky, maximálny počet ošetrení a intervaly medzi nimi.

VINIČ

■ 2,0 kg Cabrio® Top na hektár

Ošetrovanie sa vykonáva preventívne 2 – 3 x za vegetáciu s odstupom 12 – 14 dní. Pri vysokom infekčnom tlaku, silných zrážkach a intenzívnom raste listov sa odporúča intervaly skrátiť. Posledná aplikácia by mala byť vykonaná najneskôr 35 dní pred zberom. Koncentrácia prípravku v postreku by mala byť 0,2 %. Prípravok by sa nemal aplikovať viac ako 2 krát za sebou. Dávka vody sa odporúča 1000 l/ha, aby bol povrch listov dokonale pokrytý postrekom, a tým sa zabezpečila maximálna účinnosť prípravku.

6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Prípravky zo skupiny strobilurínov sa odporúča použiť maximálne 3 krát za sezónu bez ohľadu na to, proti ktorej chorobe sú naaplikované, aby sa riziko vzniku rezistencie obmedzilo na najnižšiu mieru. Zrážky 2 – 3 hodiny po ošetrení účinnok neovplyvňujú. Odporúčaná teplota pri aplikácii je do 25°C.

7. PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Prípravok používajte len v súlade s platným Zoznamom povolených prípravkov a iných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

