



Flexity®

■ FUNGICÍD ■ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 20-00718-AU



Charakteristika

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentráту pre riedenie vodou (SC) proti múčnatke trávovej v pšenici, jačmeni a proti hnejdej škvrnitosti jačmeňa v jačmeni.

Zloženie

metrafenone 300 g/l



Aplikačná dávka prípravku

0,2 – 0,5 l/ha



Doporučené množstvo vody

100 – 400 l/ha



Ochranná doba

35 dní



Letecká aplikácia

nie je



Miešateľnosť

Prípravok Flexity® je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesi je potrebné dbať na dodržanie ochranné doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

| DAM 390 | Kvapalné hnojivá | Fungicidy | Insekticidy | Rastové regulátory | Graminicidy |
|---------|------------------|-----------|-------------|--------------------|-------------|
| – | áno | áno | áno | áno* | áno |

* rešpektovať poradie miešania prípravkov



Balenie:

4 x 5 l HDPE kanister

Dôležité zmeny od posledného vydania: **žiadne**



1. SPÔSOB ÚČINKU

Flexity® je systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka metrafenone zo skupiny benzophenonov, blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Múčnatka trávová | <i>Erysiphe graminis</i> |
| Hnedá škvrnitosť jačmeňa | <i>Parenophora teres</i> |

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia.

4. REGISTROVANÁ APLIKÁCIA

| Plodina | Škodlivý organizmus | Dávka na ha | Ochr. doba (dni) | Pozn. |
|--|--|-------------|------------------|-------|
| pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová | múčnatka trávová | 0,2-0,5 l | 35 dní | |
| jačmeň jarný jačmeň ozimný | múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa | 0,2-0,5 l | 35 dní | |

Pri aplikácii v pšenici do fázy BBCH 32 dosahuje prípravok významnú vedľajšiu účinnosť proti stebelolamu.

5. ODPORUČENIE K APLIKÁCII

PŠENICA

- 0,3 – 0,5 l Flexity® na hektár

Prípravok Flexity® aplikujte pri výskyte múčnatky trávovej, spravidla od rastovej fázy objavenia sa 5. odnože do začiatku kvitnutia, keď už sú prvé peľnice viditeľné (BBCH 25 – 61).

Dávka postrekovej kvapaliny: 100 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x počas vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.

JAČMEŇ

- 0,3 – 0,5 l Flexity® na hektár


Prípravok Flexity® aplikujte pri výskyte chorôb, spravidla od rastovej fázy objavenia sa 2. odnože do začiatku klasenia (BBCH 22 – 50). Dávka postrekovej kvapaliny: 100 – 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 2x počas vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.

Optimálny termín pre aplikáciu je od konca odnožovania do vytvorenia zástavového listu obilniny.



6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Nie sú známe žiadne obmedzenia. Zrážky 1 – 2 hodiny po ošetrení účinkov neoplyvňujú. Teplota pri aplikácii do 25°C. Maximálny počet aplikácií prípravku je 2x počas vegetácie.



Prípravok používajte len v súlade s platným Zoznamom povolených prípravkov a iných prípravkov na ochranu rastlín v SR.