

**JARNÁ CIBUĽKA****■ 3,2 l Enervin Pro na hektár**

Prípravok aplikujte v rastovom štádiu od jasne viditeľného 5 listu po štádium konečného vzrastu (BBCH 15-49). Maximálny počet aplikácií je 1 x počas vegetačného obdobia. Dávka vody je 100 – 1000 l/ha.

6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Postrek nepoužívajte pri teplotách vyšších než 25°C. Dažďové zrážky 1 hodinu od zaschnutia postreku nemajú vplyv na účinok. Prípravok odporúčame použiť maximálne 1 až 2x za sezónu podľa plodiny, aby nevznikla rezistencia. Prípravok aplikujte preventívne alebo čo najskôr na začiatku výskytu choroby.

7. PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín v SR.

Flexity®**■ FUNGICÍD ■ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 20-00718-AU****Charakteristika**

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým účinkom vo forme kvapalného suspenzného koncentráту pre riedenie vodou (SC) proti múčnatke trávovej v pšenici, jačmeni a proti hnedej škvrnitosti jačmeňa v jačmeni.

Zloženie

metrafenone 300 g/l

**Aplikačná dávka prípravku**

0,2 – 0,5 l/ha

**Doporučené množstvo vody**

100 – 400 l/ha

**Ochranná doba**

35 dní

**Letecká aplikácia**

nie je

**Miešateľnosť**

Prípravok Flexity® je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi, herbicídmi, insekticídmi a kvapalnými hnojivami. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhodu optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujte do zásoby. V prípade zmesi je potrebné dbať na dodržanie ochranné doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

**Použitie v plodinách**

pšenica ozimná
pšenica jarná
pšenica ozimná tvrdá
pšenica jarná tvrdá
pšenica špalďová
jačmeň jarný
jačmeň ozimný

DAM 390	Kvapalné hnojivá	Fungicidy	Insekticidy	Rastové regulátory	Graminicidy
–	áno	áno	áno	áno*	áno

* rešpektovať poradie miešania prípravkov

**Balenie:**

4 x 5 l HDPE kanister

Dôležité zmeny od posledného vydania: **žiadne**





1. SPÔSOB ÚČINKU

Flexity® je systémovo pôsobiaci fungicídny prípravok prijímaný nadzemnými časťami rastlín a rozvádzaný po celej rastline. Účinná látka metrafenone zo skupiny benzophenonov, blokuje rast infekčných štruktúr, rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov.

2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Múčnatka trávová	<i>Erysiphe graminis</i>
Hnedá škvrnitosť jačmeňa	<i>Parenophora teres</i>

3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia.

4. REGISTROVANÁ APLIKÁCIA

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka na ha	Ochr. doba (dni)	Pozn.
pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová	múčnatka trávová	0,2-0,5 l	35 dní	
jačmeň jarný jačmeň ozimný	múčnatka trávová, hnedá škvrnitosť jačmeňa	0,2-0,5 l	35 dní	

Pri aplikácii v pšenici do fázy BBCH 32 dosahuje prípravok významnú vedľajšiu účinnosť proti steblolamu.

5. ODPORUČENIE K APLIKÁCII

PŠENICA

- 0,3 – 0,5 l Flexity® na hektár

Prípravok Flexity® aplikujte pri výskyte múčnatky trávovej, spravidla od rastovej fázy objavenia sa 5. odnože do začiatku kvitnutia, keď už sú prvé peľnice viditeľné (BBCH 25 – 61).

Dávka postrekovej kvapaliny: 100 – 400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií: 2x počas vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.

JAČMEŇ


- 0,3 – 0,5 l Flexity® na hektár

Prípravok Flexity® aplikujte pri výskyte chorôb, spravidla od rastovej fázy objavenia sa 2. odnože do začiatku klasenia (BBCH 22 – 50). Dávka postrekovej kvapaliny: 100 – 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 2x počas vegetačnej sezóny. Interval medzi aplikáciami je 21 dní.

Optimálny termín pre aplikáciu je od konca odnožovania do vytvorenia zástavového listu obilniny.

6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Nie sú známe žiadne obmedzenia. Zrážky 1 – 2 hodiny po ošetrení účinkov neoplyvňujú. Teplota pri aplikácii do 25°C. Maximálny počet aplikácií prípravku je 2x počas vegetácie.



Prípravok používajte len v súlade s platným Zoznamom povolených prípravkov a iných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

