



# Kachikoma® SL

■ INSEKTICÍD ■ REGISTRAČNÉ ČÍSLO: 21-01146-AU



## Charakteristika

Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), určený na ochranu pšenice a repky olejnej proti živočíšnym škodcom.

## Zloženie

acetamiprid 120 g/l



## Aplikačná dávka prípravku

0,35 l/ha



## Doporučené množstvo vody

200 – 400 l/ha



## Ochranná doba

podľa plodiny



## Letecká aplikácia

nie



## Miešateľnosť

Prípravok Kachikoma® SL je kompatibilný s bežne používanými fungicídmi a insekticídmi. Pri použití prípadných kombinácií je potrebné dbať na zhotovenie optimálnych aplikačných termínov pre jednotlivé prípravky. Pri príprave aplikačnej zmesi je potrebné jednotlivé koncentráty navzájom nemiešať, ale pridávať ich do postrekovača oddelene a za stáleho miešania. Odporúčame najprv urobiť skúšku na miešateľnosť oboch prípravkov v príslušnej koncentrácii za použitia miestnej vody. Pripravenú zmesnú aplikačnú kvapalinu je potrebné bezodkladne spotrebovať, nikdy ju nepripravujete do zásoby.

V prípade zmesí je potrebné dbať na dodržanie ochrannej doby a bezpečnostné opatrenia, stanovené aj pre druhý prípravok.

DAM 390	Kvapalné hnojivá	Fungicidy	Insekticidy	Rastové regulátory	Graminicídy
áno	áno*	áno	áno	áno	áno

\* Treba vopred preveriť miešateľnosť.



## Balenie:

1 l HDPE fľaša

Dôležité zmeny od posledného vydania: **žiadne**



## 1. SPÔSOB ÚČINKU

Kachikoma® SL je systémovo pôsobiaci insekticíd zo skupiny neonicotínoidov. Pôsobí ako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotínový Ach receptor v postsynaptickej membráne nervového systému živočíšnych škodcov. Prípravok pôsobí systémovo aj translaminačne, prechádza celým profilom listu. Účinkuje ako kontaktný a požerový jed vo veľmi nízkych dávkach, ma relatívne rýchle počiatočné pôsobenie. Vyniká dlhodobým a vyrovnaným reziduálnym účinkom proti širokému spektru živočíšnych škodcov. Prípravok je veľmi flexibilný k vyššej teplote v priebehu aplikácie, v rastline je rozvádzaný akropetálne (nahor, do novo narastajúcich častí).

## 2. SPEKTRUM ÚČINNOSTI

Blyskáčik repkový	<i>Meligethes aeneus</i>
Krytonos šešuľový	<i>Ceutorrhynchus obstrictus</i>
Voška ovsená	<i>Sitobion avenae</i>
Voška čremchová	<i>Rhopalolosphu padi</i>

## 3. NÁSLEDNÉ PLODINY

Pri dodržaní návodu na použitie nie sú známe žiadne obmedzenia.

## 4. REGISTROVANÁ APLIKÁCIA

Plodina	Škodlivý organizmus	Dávka na ha	Ochranná doba (dni)	Pozn.
<b>pšenica ozimná, pšenica jarná</b>	voška ovsená voška čremchová	0,35 l	28 dní	
<b>repka ozimná, repka jarná</b>	blyskáčik repkový	0,35 l		
	krytonos šešuľový	0,35 l	28 dní	

## 5. ODPORUČENIE K APLIKÁCI

### PŠENICA

#### ■ 0,35 l Kachikoma® SL na hektár

Proti voške ovsenej a voške čremchovej ošetrte podľa signalizácie na začiatku náletu škodcov v rastovej fáze od začiatku klasenia až po koniec vývoja plodu (BBCH 51 – 79). Interval medzi ošetreniami je 14 dní. Dávka vody je 200 – 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 2x

### REPKA

#### ■ 0,35 l Kachikoma® SL na hektár

Ošetrte na začiatku náletu škodcov. Proti blyskáčikovi repkovému ošetrte v rastovej fáze vývoja súkvetia plodiny (BBCH 51 – 59). Proti krytonosovi šešuľovému ošetrte v rastovej fáze od konca kvitnutia po začiatok vývoja plodu plodiny (BBCH 69 – 71). Dávka vody je 200 – 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x pred kvitnutím repky alebo po jej odkvitnutí. Neaplikujte na kvitnúcu repku.



## 6. PODMIENKY PRE APLIKÁCIU

Aplikácia proti šesťzlozovým škodcom repky a proti škodcom v čase kvitnutia plodín je možná len v mimotelovom čase včiel v neskorších večerných hodinách! Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte kontaktu včiel s ošetrovanou kultúrou po dobu aspoň 12 hodín! Pred aplikáciou v sadoch je potrebné zabezpečiť, aby v podraсте ošetrovaných stromov neboli kvitnúce buriny. Aplikácia je možná len v bezletovom čase včiel, neskôr večer. Ošetrovanie plodín je potrebné vykonať tak, aby nedošlo k úletu aplikovanej kva-paliny na necieľový kvitnúci porast. Odporúčaná teplota pri aplikácii je do 25°C. Reziduálna účinnosť je 2 – 3 týždne. Zrážky 2 hodiny po ošetrovaní účinkov neovplyvňujú. Nepoužívajte prípravky s rovnakou účinnou látkou viackrát za sebou aby nevznikla rezistencia.

**Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom povolených prípravkov na ochranu rastlín v SR.**