


Formulácia prípravku Medax® Max je navrhnutá tak, aby ste prípravok nasypali priamo do primiešavacej nádrže postrekovača. Nerozpúšťajte prípravok Medax® Max s vodou zvlášť vo vedre pred nasypaním do primiešavacieho zariadenia. Zabráňte nasiaknutiu prípravku vodou.

Tank-mix: správny postup

- 1** Naplňte približne ½ nádrže postrekovača vodou



- 2** Zapnite primiešavacie zariadenie na strednú až vysokú intenzitu, aby sa Medax® Max rýchlo rozpustil. Uistite sa,



že voda preteká v primiešavacej nádobe i po jej stenách pred pridaním prípravku. Odporúčame dodržiavať dostatočný prietok vody, aby bol prípravok rozpustený a odstránený z primiešavacieho zariadenia.

- 3** Postupne nasypťte Medax® Max priamo do prúdu vody, pritom prispôbajte rýchlosť sypania rýchlosti rozpúšťania. **Odporúčame pomalé sypanie krúživým pohybom! Nesypťte prípravok príliš dlho na jedno miesto. Zabezpečíte si tým plynulé rozpúšťanie v prúde vody a vyhnete sa lokálnemu upchatiu.**

NESYPTE Medax® Max priamo do primiešavacej nádrže BEZ DOSTATOČNÉHO PRIETOKU VODY A PRIMIEŠAVANIA v NÁDRŽI

Pridávajte prípravky v poradí: 1. prípravok proti peneniu, ak je to nutné; 2. hnojivo, stopové soli (pevné); 3. pevné formulácie; 4. kvapalné formulácie; 5. rozpúšťadlá, emulzie, koncentrát

pevné
alebo
kvapalné
hnojivo

pevná formulácia


**WG / WP
SG / SP**

kvapalná formulácia

**SC / CS / SL / SE / EW
EO / EC / OD / DC / ME**

- 4** Doplňte vodu do postrekovača, pridajte zmäčadlo (podľa formulácie).

- 5** Vypláchnite obal



- 6** Obal pevne uzatvorte



- 7** Kontinuálne premiešavajte nádrž. Ak je Medax® Max pridaný do nádrže postrekovača, mal by byť kontinuálne premiešavaný a čo najskôr aplikovaný.



Medax® Max

Maximálna flexibilita

BASF

We create chemistry